REMERCIEMENTS

Les auteurs sont reconnaissants envers le Centre Carter pour son soutien financier, matériel et moral et son assistance d'expert sans lesquels l'élaboration de ce module aurait été impossible.

Nous souhaitons également remercier la Faculté d'Éducation des Enseignants et des Sciences Sanitaires de Dila (Dilla College of Teachers' Education and Health Sciences), l'Université de Jimma et la Faculté des Sciences Médicales de Gondar (Gondar College of Medical Sciences) pour avoir accueilli les ateliers successifs qui ont constitué la base de ce modul

PARTIE 1

INTRODUCTION

1.1. Objectif du module

Ce module est destiné à

Dans la partie II, les questions sont conçues pour des groupes spécifiques : agents de santé (AS), infirmiers de santé publique (ISP) et techniciens de laboratoire (TL).

Sélectionnez les questions de la section correspondant à votre catégorie professionnelle et répondez-y.

Lorsque vous êtes sûr d'en avoir terminé avec le module principal, vous pouvez commencer à étudier le module auxiliaire correspondant à votre profession ou

PARTIE 2

MODULE CENTRAL

2.1. Test préliminaire

11. L’approche syndromique se fonde essentiellement sur les antécédents du patient.
12. Les douches génitales post-coïtales sont aussi efficaces que l’utilisation des préservatifs dans la prévention des IST.
13. La prise d’antibiotiques avant un rapport sexuel peut prévenir la contamination par une IST.
14. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est erronée ?
    A. Les IST se classent au deuxième rang, après le paludisme, des maladies dont l’impact socio-économique sur les communautés tropicales est le plus lourd.
    B. Dans les pays en développement, les IST représentent 15 % de la charge de morbidité et affectent plus particulièrement la population urbaine.
    C. dont 6l4 0.0oTJ 0onde essen pay(2e.) (l)6(us)4(pBDC -0.002 19.35 0 es)4(ni)6(t)2(al0(s)
    B. lon v(ang)10(.)2()6(i)6 det s p p6(ne.)2( )Tj 0e B prC. r

D. La sélection soigneuse des partenaires sexuels

E. Aucun

18. Parmi ces différentes approches d'éducation à la santé, laquelle est la plus efficace dans la prévention des IST ?

A. Le transfert d'informations par des professionnels vers la communauté

B. L'éducation à la santé sous forme de dialogue

C. Une méthode participative d'éducation à la santé

D. Une éducation à la santé s'appuyant sur les médias

E. B et C

19. Nommez deux symptômes courants de l'urétrite : _____ et _____

20. _____ désigne un syndrome clinique aigu résultant d'une infection ascendante à partir du col utérin et/ou du vagin.

21. _____ et _____ entraînent souvent un gonflement du scrotum.

22. Quels sont les facteurs contribuant à l'augmentation de la prévalence des IST (nommez-en 5)?S3t1n17 092.

29. S((m)-3(ez)1)Tj 0.001-3(e5.5472)u10(n a -1)n((t -1).)27 -1

1. La gale peut être considérée comme une maladie sexuellement transmissible.

   A. Vrai B. Faux

2. Le médicament le plus approprié en cas d'écoulement vaginal est la benzathine-pénicilline.

   A. Vrai B. Faux

3. Un écoulement vaginal blanchâtre, épais et inodore est caractéristique d'une candidose.

   A. Vrai B. Faux

4. L'arrivée récente d'un nouveau partenaire fait partie des facteurs de risque de contamination par une IST.

   A. Vrai B. Faux

5. Lequel de ces agents pathogènes est un organisme intracellulaire à Gram négatif ?

   A. *T.Pallidum*

   B. *N. gonorrhoeae*

   C. *C.trachomatis*

   D. *Phthiru Td (TJ 0 Tc 0 TBMCID 24 >>B >>BDt0o)Tj 3 0 Td ( )Tj 3 0 Td (B)Tj>>BD 5.(a)-6(llid)-6(u)2.9 0 TBMCIpc 0 Tw 0.83 0 Td 0*

13. La coloration de Gram d’un écoulement vaginal anormal peut permettre de détecter :

    A.

l’absence de traitement, ces infections sont susceptibles de migrer vers le haut à partir de l’appareil génital et de provoquer une maladie inflammatoire pelvienne (MIP).

La prise en charge des IST est une priorité non seulement du fait de leur forte prévalence, mais aussi parce qu’elles peuvent être traitées facilement si les individus touchés font appel à un service de santé. Dans les pays en développement, le diagnostic en laboratoire de la plupart des maladies peut s’avérer difficile. Même lorsque des tests sont disponibles, le temps nécessaire à l’obtention des résultats retarde souvent le traitement des cas d’IST (1).

L’un des objectifs fondamentaux des programmes de contrôle des IST est la détection et le traitement précoces de l’infection, de préférence lors du premier contact des patients avec le système de santé (1).

Ainsi, pour être efficace et efficient, tout programme de santé publique doit pouvoir s’appuyer sur un outil rapide, peu coûteux, simple, précis et permettant une mise en œuvre à grande échelle du traitement des IST par des prestataires de santé aux niveaux d’expertise et de formation différents. Dans le cas présent, l’approche syndromique est la plus appropriée.

2.3. Objectifs d’apprentissage

Après avoir étudié le module, le lecteur saura :

1. définir les infections sexuellement transmissibles (IST) ;
2. considérer les IST comme l’un des principaux problèmes de santé publique en Éthiopie ;
3. identifier les complications potentielles des IST non traitées ;
4. décrire les caractéristiques cliniques d’un syndrome d’IST et les agents pathogènes correspondants ;
5. identifier les facteurs de risque de transmission (ou d’acquisition) d’IST ;
6. décrire les avantages de l’approche syndromique dans la prise en charge des IST ;
7. décrire les stratégies de prévention et de contrôle des IST ;
8. reconnaître le rôle joué par chaque catégorie de professionnels de santé ;

nombreuses régions d'Afrique ont révélé des taux de prévalence de l'ordre de 10 % pour la syphilis et compris entre 10 et 20 % pour la gonorrhée.

Parmi ces IST, on trouve la gonorrhée, l'infection à chlamydia, la syphilis et la trichomonase. Sur ces 340 millions de cas d'IST, 151 millions se trouvent en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est, 69 millions en Afrique sub-saharienne et 38 millions en Amérique latine et dans les pays caribéens.

2.7. Étiologie et pathogenèse

2.7.1. Étiologie

Les agents pathogènes des IST comprennent :

a. les bactéries

Neisseria gonorrhoeae (responsable de la gonorrhée)

Chlamydia trachomatis (infection à chlamydia)

Treponema pallidum (syphilis)

Haemophilus ducreyi (chancre mou)

Calymmatobacterium granulomatis (granulome inguinal ou donovanose)

Gardnerella vaginalis

b. les virus

écoulement urétral ou brûlures à la miction chez l'homme ;

écoulement vaginal chez la femme (l'écoulement vaginal est anormal lorsque la femme remarque un changement de couleur, de quantité ou d'odeur) ;

douleur abdominale basse chez la femme (intensité et type de douleur, déclenchement, qualité de la douleur, rayonnement vers d'autres parties du corps et présence d'un écoulement vaginal ou d'autres symptômes systémiques tels que la fièvre, les nausées et les vomissements) ;

De nombreuses femmes sont concernées par un écoulement vaginal peu abondant, clair et inodore (leucorrhée physiologique). Ce phénomène est normal. Cependant, il devient anormal lorsqu'un changement est constaté dans la quantité, la couleur et l'odeur de l'écoulement.

2.8.3. Ulcère génital

La syphilis primaire, l'herpès génital, le chancre mou, le lymphogranulome vénérien et le granulome inguinal sont des lésions ulcératives courantes de l'appareil génital masculin et féminin. Les ulcères génitaux sont le plus souvent causés par les agents pathogènes suivants :

Treponema pallidum

Virus de l'herpès simplex

Haemophilus ducreyi

Chlamydia trachomatis (sérotypes L1, L2 et L3)

Calymmatobacterium granulomatis

a) Syphilis : La présentation clinique de la syphilis comporte trois stades. L'ulcère génital apparaît au cours de la phase primaire. Il se présente sous la forme d'une papule évoluant rapidement vers une lésion indurée indolore à base nette et à bord surélevé dénommée chancre dur. Il apparaît généralement dans les trois semaines suivant l'exposition (temps d'incubation compris entre 10 et 90 jours). Le stade secondaire commence un mois plus tard. Il se caractérise par une éruption polymorphe généralement maculo-papuleuse, notamment sur la paume des mains et la plante des pieds, et par des excroissances verruqueuses dans des zones Id A(és)40 leincntéon cs(ai)6(ns)1Tw 8.,oureih3(porpér)70ecp(s)4( )]Tse pa(e d)10adnta(ant)m

I (ai)6(ub)10 etiour(ai)6((e d)1uem)-3nt

porteurs du VIH, les épisodes symptomatiques sont plus longs et la maladie est plus sévère, l'atteinte tissulaire et le taux de dissémination étant importants.

c) Chancre mou : Il s'agit d'une cause courante d'ulcère génital dans les pays en développement. Sa propagation dépend du nombre de partenaires d'une personne infectée, les prostituées semblant représenter le principal vecteur de l'infection. Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes et ces dernières sont généralement asymptomatiques. À chaque rapport sexuel, le risque d'être contaminé par le VIH est 10 à 300 fois plus important pour les individus porteurs de cette maladie. Les lésions, qui sont douloureuses, évoluent progressivement d'une petite papule vers une pustule puis une ulcération à bords mous dénommée chancre mou. Une adénopathie inguinale nécrotique et fluctuante (bubons) fait suite à l'ulcération.

d) Lymphogranulome vénérien (LGV) : La maladie se présente initialement sous la forme d'une petite papule indolore évoluant vers une ulcération. Après une semaine environ, une lymphadénopathie douloureuse et localisée peut survenir. Les lésions ne sont pas apparentes.

e) Granulome inguinal : Il s'agit d'une maladie ulcérative à progression chronique sans symptôme systémique. Elle se présente souvent sous la forme d'une lésion génitale non purulente, qui évolue d'une petite papule ferme vers un ulcère indolore rouge vif et à base non purulente.

2.8.4. Douleur abdominale basse causée par une maladie inflammatoire pelvienne (MIP)

Les maladies inflammatoires pelviennes (MIP) font référence à un syndrome clinique aigu résultant d'une infection ascendante à partir du col de l'utérus et/ou du vagin. Elles affectent les structures supérieures des organes génitaux féminins. Le terme MIP englobe l'endométrite, la paramétrite, la salpingite, l'oophorite, la péritonite pelvienne, l'abcès tubo-ovarien et l'inflammation du foie, de la rate ou de l'appendice.

Les agents pathogènes

2.9. Diagnostic

Le diagnostic des IST s'appuie sur les méthodes suivantes :

2.9.1. L'approche syndromique

Caractéristiques de l'approche syndromique (prise en charge syndromique des cas) :

- classer les principaux agents responsables selon le syndrome clinique qu'ils engendrent ;
- utiliser des diagrammes de flux pour aider le prestataire de santé à identifier les causes d'un syndrome donné ;
- traiter le patient pour toutes les causes majeures du syndrome ;
- s'assurer que les partenaires/patients sont traités, conseillés, éduqués en
-

ii. Un grand nombre de patients atteints d'une IST cherchent de l'aide auprès des établissements de soins de santé primaires, qui ne disposent ni des compétences nécessaires, ni du diagnostic étiologique.

2. Écoulement vaginal : cf. 7.2 Diagrammes 2-1 et 2-2
3. Ulcère génital : cf. 7.2 Diagramme 3
4. Douleur abdominale basse chez la femme : cf. 7.2 Diagramme 4
5. Gonflement du scrotum : cf. 7.2 Diagramme 5
6. Bubon inguinal : cf. 7.2 Diagramme 6
7. Conjonctivite néonatale : cf. 7.2 Diagramme 7

Fig : Au Cambodge, dans un marché de la province de Svay Rieng, des agents hospitaliers montrent à des chauffeurs de taxis comment utiliser correctement un préservatif.

Source : Net work family health international volume 20, Numéro 4, 2001

2. Éducati on en matière de pré vention des IST/du VIH

L'éducation est la pierre angulaire du contrôle des IST. L'implication du grand public est impérative. La connaissance du lien entre le sexe et les IST est particulièrement essentielle. Diverses méthodes de sensibilisation peuvent être utilisées, notamment l'éducation publique, les réunions d'information dans des lieux de culte et les reportages et documentaires à la télévision et à la radio. L'éducation sexuelle doit devenir une discipline majeure dans les programmes scolaires. Le public et les patients doivent être encouragés à solliciter les services appropriés au sein des structures de santé.

Il est également primordial, dans le cadre de la prévention des IST et du VIH, d'expliquer aux patients le lien entre les deux et de leur faire comprendre que le même comportement à risque peut entraîner la contamination par une IST et par le VIH. Les patients doivent être informés sur les comportements sexuels sans risque : abstinence,

fidélité mutuelle et actes sexuels sans risque tels que le sexe sans pénétration ou avec préservatif.

Le B.A-BA de la prévention des IST

L'abstinence est la seule protection fiable à 100 %.

Fidélité mutuelle : toujours avoir des rapports sexuels avec le/la même partenaire. Cette personne ne doit pas non plus avoir de relations sexuelles avec quelqu'un d'autre et ne doit pas avoir d'IST (important : il est généralement impossible de savoir si une personne souffre d'une IST simplement en l'observant. Les individus porteurs d'une IST, y compris le VIH, ont rarement l'air malade).

Utilisation systématique du préservatif : s'en servir correctement et à chaque rapport.

L'approche sanitaire en matière d'éducation à la santé met l'accent sur le dialogue, et non seulement sur le transfert d'informations, et cette participation ou implication de la communauté dans le processus décisionnel peut apporter d'excellents résultats dans la prévention des IST.

3. La détection et le traitement précoces des cas

La détection et le traitement précoces des cas sont essentiels. Ils permettent d'éviter des complications graves chez les patients et rendent service à la communauté en empêchant de nouvelles contaminations.

4. L'identification, la notification et l'examen des partenaires sexuels

Il s'agit d'une activité importante de santé publique consistant à retrouver les partenaires des individus reconnus porteurs d'une IST, à les informer de leur probable exposition à l'infection et à leur proposer des soins et des conseils. Le but de cet exercice est de rompre le cycle de transmission des IST. Les patients asymptomatiques peuvent être des sources d'infection au sein de la communauté. La prise en charge des partenaires consiste à traiter tous les individus ayant eu des rapports sexuels avec le patient pour la même IST, même s'ils ne présentent pas de signes d'infection.

5. Le conseil comme activité de prévention et de contrôle

Le conseil doit en faire partie intégrante de toute stratégie globale de prévention et de contrôle des IST et du VIH. Les activités spécifiques dans ce domaine dépendront des

Questions

1. Quel est le diagnostic probable de ce patient ?
2. Quelle doit être la prise en charge du patient ?
3. Le patient a-t-il besoin de subir des tests en laboratoire ? Pourquoi ?

L'agent de santé a traité le patient par injections de spectinomycine et comprimés de tétracycline. Il lui a également parlé des causes de son problème et l'a convaincu d'amener sa partenaire sexuelle le jour suivant.

Le lendemain, l'agent de santé a examiné la partenaire et a découvert un ulcère indolore sur sa vulve. Il n'a constaté aucun écoulement vaginal. Les zones inguinale et abdominale étaient normales.

Questions fondées sur l'étude de cas ci -dessus

1. Quel est le diagnostic probable de la partenaire ?
2. Comment l'agent de santé doit-il prendre en charge la partenaire ?

3.1.4. Étiologie et pathogenèse

3.1.4.1. Étiologie

Les IST sont un groupe de maladies contagieuses se transmettant essentiellement par voie sexuelle et causées par une grande diversité d'agents pathogènes bactériens, viraux, protozoaires et fongiques et d'ectoparasites.

Causes bactériennes	Maladie
Neisseria gonorrhoeae	Gonorrhée
Chlamydia trachomatis	Urétrite et Lymphogranulome

Causes virales	Maladie
VIH-1 et VIH-2	VIH/sida
Virus de l'herpès simplex (type 1 et 2)	Herpès génital
Papillomavirus humain	Verrue génitale
Virus de l'hépatite B	Hépatite

Causes protozoaires	Maladie
Trichomonas vaginalis	Trichomonase

Causes fongiques	Maladie
Candida albicans	Candidose vaginale
Ectoparasites	Maladie
Phthirus pubis (poux du pubis)	Pédiculose
Sarcoptes scabiei	Gale

3.1.4.2. Pathogenèse

Seuls les agents pathogènes les plus importants seront abordés dans ce chapitre.

N. gonorrhoeae est un diplocoque intracellulaire à Gram négatif. Il commence par s'attacher aux cellules muqueuses prismatiques, puis les pénètre et y prolifère, déclenchant ainsi une réaction inflammatoire locale ou des manifestations systémiques (1, 5).

C. trachomatis est un agent pathogène intracellulaire obligatoire à Gram négatif. L'infection muqueuse dont il est responsable déclenche une réaction inflammatoire locale. Ensuite, la pathogenèse de *C. trachomatis* n'est pas encore bien comprise. Certains sérotypes de *C. trachomatis*, responsables du lymphogranulome vénérien, colonisent le système lymphatique local, entraînant une nécrose et un abcès dans les ganglions lymphatiques inguinaux.

N.B. *N.gonorrhoeae* et *C.trachomatis* peuvent remonter dans l'appareil génital supérieur et provoquer une infection de l'endomètre (endométrite), des trompes de

C’est pourquoi une approche syndromique est recommandée par l’OMS depuis 1990 pour diagnostiquer et traiter les IST.

Cette approche présente plusieurs avantages :

Elle offre un traitement adéquat, même pour une infection mixte.

Elle est applicable dans les unités de soins disposant de structures de laboratoires minimales.

Elle permet d’établir un diagnostic et d’initier un traitement dès la première consultation.

Elle réduit la nécessité de renvoyer les patients devant des structures de soins supérieures.

Elle est facile à enseigner et simple à appliquer.

3.1.5.2. Les objectifs de la prise en charge des IST sont :

le traitement facile des cas ;

la prévention et le traitement des complications ;

le traitement des partenaires sexuels ;

l’éducation et le conseil ;

le suivi et l’aiguillage.

Les prestataires de santé ont été confrontés à sept syndromes courants :

1. le syndrome d’écoulement urétral (seulement chez l’homme) ;
2. le syndrome d’écoulement vaginal chez la femme ;
3. le syndrome d’ulcère génital ;
4. le syndrome de douleur abdominale basse chez la femme ;
5. le gonflement du scrotum ;
6. le syndrome de bubon inguinal ;
7. la conjonctivite néonatale.

A. Écoulement urétral chez l’homme

Caractéristiques cliniques

Il s'agit d'un écoulement du pénis avec ou sans douleur à la miction (dysurie). Généralement, lorsque le patient se plaint d'un écoulement urétral et/ou de dysurie, l'agent de santé doit se renseigner sur ses antécédents sexuels. L'écoulement urétral peut être constaté lors de l'examen. Si ce n'est pas le cas, il faut traire le pénis pour confirmer la présence d'un écoulement. Une rougeur et un gonflement du méat urétral (ouverture) sont généralement observables. L'agent de santé doit également rechercher d'autres signes d'IST tels qu'un ulcère génital, une hypertrophie des ganglions lymphatiques inguinaux, etc.

Les causes les plus fréquentes d'écoulement urétral chez l'homme sont la gonorrhée et l'infection à chlamydia. Dans le cas d'une infection à chlamydia, les symptômes d'inflammation urétrale surviennent entre 7 et 28 jours après le rapport sexuel incriminé. Ils consistent en un léger écoulement laiteux et mucoïde accompagné d'une dysurie et d'une gêne au niveau de l'urètre. L'écoulement est généralement plus marqué le matin.

Dans le cas d'une infection gonococcique, les symptômes surviennent dans les 2 à 10 jours suivant le contact sexuel incriminé.

L'écoulement est généralement de couleur blanche tirant sur le jaune et s'accompagne d'une sévère sensation de brûlure à la miction.

Prise en charge
Utilisez le diagramme de flux concernant le syndrome d'écoulement urétral (Annexe II diagramme 1).

B. Syndrome d'écoulement vaginal

Caractéristiques cliniques

Un écoulement vaginal clair et inodore peut survenir pendant certaines phases du cycle menstruel, l'activité sexuelle, la grossesse et l'allaitement. Toutefois, dans le cas du syndrome d'écoulement vaginal, la patiente se plaint de pertes dont la couleur, l'odeur, la consistance ou la quantité sont différentes de celles de l'écoulement habituel. Ce symptôme peut s'accompagner de démangeaisons vaginales ainsi que de douleurs à la

La plupart des femmes souffrant d’une infection à chlamydia sont asymptomatiques. Cependant, on constate parfois un écoulement vaginal jaunâtre et mucopurulent, une dysurie, une miction fréquente et une dyspareunie (douleurs pendant les rapports sexuels).

Prise en charge

Utilisez le diagramme de flux concernant le syndrome d’écoulement vaginal (Annexe II diagramme 2-1).

C. Syndrome d’ulcère génital

Caractéristiques cliniques

Un ulcère génital peut également être causé par un granulome inguinal (donovanose) ou un LGV (lymphogranulome vénérien).

Prise en charge

Utilisez le diagramme de flux concernant l'ulcère génital (Unité 7.2 diagramme 3).

D. Syndrome de douleur abdominale basse chez la femme (MIP)

Caractéristiques cliniques

Ce syndrome se caractérise par une douleur abdominale basse, en particulier pendant les rapports sexuels, et par un écoulement vaginal. La patiente se plaint généralement de ces symptômes ainsi que de fièvre peu de temps après la menstruation. À l'examen clinique, l'agent de santé peut observer une fièvre de 38°C et une sensibilité dans le bas de l'abdomen, parfois accompagnée d'une douleur à la décompression. L'examen pelvien permet de détecter :

- un écoulement cervical ;
- une douleur au mouvement du col de l'utérus ;
- un utérus sensible à l'examen bimanuel ;
- des annexes (ovaires, trompes de Fallope) sensibles à l'examen bimanuel ;
- parfois une masse dans les annexes.

La présence d'un ulcère génital et d'une hypertrophie des ganglions lymphatiques inguinaux doit être recherchée.

Ce syndrome est fréquemment causé par la gonorrhée ou une infection à chlamydia ou par une infection bactérienne anaérobie.

N.B. Les causes de douleur abdominale basse nécessitant un traitement chirurgical en urgence doivent être écartées (appendicite, grossesse extra-utérine, occlusion intesti [(Les)4(c2(e)] 0.004)4(e .cl)2(ut4 Tc)3ne,

E. Syndrome de gonflement du scrotum

Caractéristiques cliniques

Lorsqu'il est infecté, le testicule devient enflé, chaud et extrêmement douloureux. Si un traitement rapide et efficace n'est pas dispensé, les patients peuvent être victimes d'une perte de fertilité. Ce syndrome est généralement causé par *N. gonorrhoeae* ou *C. trachomatis*, mais peut aussi être provoqué par *Escherichia coli* ou le virus des oreillons.

Prise en charge

Utilisez le diagramme de flux concernant le syndrome de gonflement du scrotum (Unité 7.2 diagramme 5).

F. Syndrome de bubon inguinal

Caractéristiques cliniques

Ce syndrome se traduit par une hypertrophie des ganglions lymphatiques inguinaux de plus de 2 cm causée par une IST et pouvant s'accompagner ou non d'un écoulement. Les patients se plaignent d'un gonflement généralement douloureux au niveau de l'aine. Les antécédents d'ulcère et d'écoulement génital doivent être demandés.

Lors de l'examen clinique, l'agent de santé observe une hypertrophie unilatérale ou bilatérale des ganglions lymphatiques pouvant être douloureuse et fluctuante. Un examen vaginal doit être pratiqué afin de détecter un ulcère et un écoulement génital. Chez l'homme, la présence d'un ulcère génital et d'un écoulement urétral doit être recherchée.

Les causes les plus courantes de ce syndrome sont le lymphogranulome vénérien, le chancre mou et le granulome inguinal. Chez les patients souffrant de la syphilis, l'hypertrophie des ganglions lymphatiques inguinaux est indolore et ne produit pas de

-

C’est pourquoi les programmes destinés à lutter contre les IST doivent intégrer le VIH/sida comme l’une des composantes les plus importantes. L’agent de santé doit savoir comprendre le lien entre les IST et le VIH/sida et établir le pronostic des patients souffrant de ces maladies pour permettre une prise en charge précoce des cas et des complications.

Vous avez à présent terminé le module principal et le module auxiliaire, mais il vous reste certaines activités à effectuer, comme indiqué ci-dessous.

1. Lisez l’analyse des missions confiées aux différentes catégories de l’équipe du Centre de Santé dans l’Unité 4.
2. Effectuez le pré-test en tant que post-test.

   N.B: Utilisez une feuille séparée.
3. Confrontez vos réponses au pré-test et au post-test aux corrigés figurant dans l’Unité 7.3 et évaluez vos progrès.

3.2. Module satellite pour les infirmiers de santé publique

3.2.1. Consignes d'utilisation du module

Avant de lire ce module satellite, assurez-vous que vous avez étudié le module central et complété le test préliminaire.

Lisez ce module satellite.

3.2.2. Objectifs d'apprentissage

Lorsque vous aurez étudié ce module, vous saurez :

apporter la prise en charge infirmière adéquate conformément à l'approche syndromique des IST

décrire les méthodes de prévention des IST

assurer le signalement et l'enregistrement des cas

dispenser des conseils aux couples porteurs d'IST

3.2.3. Considérations infirmières dans le traitement des IST

Tableau 3.2.1: Effets secondaires courants et responsabilités infirmières liées aux médicaments fréquemment utilisés dans le traitement des IST (2, 8)

N°	Médicament	Dose adulte moyenne	Effets secondaires courants et contre - indications	Responsabilité infirmière
1	Ciprofloxacine	250 mg par voie orale deux fois par jour	Grossesse, allaitement et enfants de moins de 16 ans	Administrez une dose orale 2 heures avant ou après la prise d'anti-acides, surveillez les *ingesta* et *excreta*.
2	Doxycycline	100 mg deux fois par jour	Insuffisance rénale, grossesse, enfants jusqu'à 8 ans	Administrez la doxycycline avec de la nourriture. Administrez avec précision 1 ou 2 heures après l'ingestion d'anti-acides ou de lait.
3	Métronidazole	500 mg deux fois par jour	Premier trimestre de la grossesse	Administrez avec précaution chez les patients souffrant de troubles du système nerveux.
4	Clotrimazole	Comprimé de 100 mg à insérer tous les jours dans le vagin pendant 7 jours consécutifs	Crampes abdominales basses, nausées, vomissements, légères brûlures ou irritations vaginales	Soyez attentif aux irritations ou à la douleur ; expliquez à la patiente comment éviter que le médicament n'entre en contact avec les yeux ; dites-lui d'éviter les rapports sexuels.
5	Tétracycline	250-500 mg quatre fois par jour	Nausées, vomissements, bouche douloureuse, taches blanches sur la muqueuse buccale, diarrhée, éruptions cutanées	Administrez avec précision 1 ou 2 heures après l'ingestion d'anti-acides ou de lait et 1 ou 2 heures après un repas.
6	Érythromycine base	500 mg par voie orale quatre fois par jour pendant 7 jours	Nausées, vomissements, diarrhée, éruptions cutanées	Administrez à jeun et avec de l'eau ; limitez la prise de nourriture juste avant ou après l'administration

- Symptômes associés à la douleur,
- Aspect temporel.

présence d’un écoulement vaginal,

dernières menstruations et

symptômes systémiques tels que la fièvre, les nausées et les vomissements.

Gonflement du scrotum

déclenchement,

douleur,

antécédents de traumatismes et

écoulement urétral concomitant.

Bubon inguinal

le déficit de connaissance sur la nature de la maladie et le risque élevé de propagation de l'infection concernée et d'autres IST, y compris le VIH,

le potentiel de réinfection.

3.2.7. Interventions infirmières en matière d’IST

Les considérations suivantes sont importantes pour les interventions infirmières en matière d’IST.

3.2.7.1. Réduire l’anxiété

Le confort et l’intimité tout au long du processus ainsi que la garantie verbale et non verbale de confidentialité sont essentielles pour établir et maintenir un lien de confiance. Le patient doit être encouragé à exprimer sa frustration et ses sentiments. La communication permet de soulager l’anxiété et d’acquérir une meilleure compréhension des problèmes.

3.2.7.2. Éduquer les pat(padt Tw 2.222 0 Td (.)Tj da)10( )]T77.222 (2)Tj 0.((2)T)a351

ii. Les gants

Enfilez des gants juste avant un contact avec les muqueuses et la peau lésée. Les gants doivent être systématiquement portés lors de l'examen de parties génitales. Tout écoulement, sécrétion ou pus doit être considéré comme potentiellement contagieux. Les liquides biologiques et les tissus de patients souffrant d'IST systémiques, du VIH/sida, du virus de l'hépatite B (VHB), du cytomégalovirus (CMV), de la syphilis et de la gonorrhée disséminée doivent également être considérés comme potentiellement contagieux. Lorsqu'un toucher vaginal et un toucher rectal sont pratiqués chez une femme pour rechercher des signes d'IST, les gants doivent être changés après l'examen vaginal afin d'éviter la transmission d'une infection à chlamydia ou du virus de l'herpès simplex du col de l'utérus ou du vagin vers le rectum.

iii. Le prélèvement et le transport d'échantillons

- Tous les échantillons doivent être correctement étiquetés de façon à pouvoir identifier leur origine. Des étiquettes/signes particuliers sont nécessaires pour plus de précautions.
- Tous les échantillons de laboratoire doivent être manipulés avec le même soin.
- Transportez tous les (nouveaux) échantillons dès que possible à destination des laboratoires.

iv. Le port de vêtements de protection pour prévenir les éclaboussures

Portez des vêtements de protection en cas de contact avec les muqueuses pendant un accouchement ou un examen ou en manipulant un nouveau-né.

3.2.8. L'enregistrement et le signalement dans les programmes de contrôle des IST

Dans tout programme de contrôle, la collecte de données représente une étape importante de l'évaluation. Il s'agit d'un processus interactif consistant à récolter, dans un premier temps, des informations de base. Cependant, au cours de la mise en œuvre du programme, des données plus précises doivent être collectées pour permettre l'évaluation. Ces données proviennent de patients. Lorsqu'ils se présentent au Centre

3.3. Module satellite pour les techniciens de laborato ire

3.3.1. Consignes d’utilisation du m odule

Avant de lire ce module satellite, assurez-vous que vous avez complété le test préliminaire et étudié le module central.

Lisez ce module satellite.

3.3.3. Mesures de précaution

Tous les prélèvements doivent être considérés comme des infections potentielles.

Portez systématiquement des gants lors du prélèvement de sang ou de liquide sécrété par les ulcères.

Les coupures, les écorchures et les plaies sur les mains doivent être recouvertes avec du ruban adhésif.

Jetez ou stérilisez correctement le matériel contaminé.

3.3.4. Source et prélèvement d'échantillons

La source des échantillons utilisés dans le diagnostic d'une IST peut être :

I. un écoulement
II. du sang
III. un grattage cutané

3. Réalisez un frottis sur lame de l'écoulement. Pendant cette procédure, prenez garde de ne pas endommager les cellules de pus, qui permettent de poser un diagnostic de présomption de gonorrhée lorsqu'elles contiennent des diplocoques à Gram négatif. Faites donc rouler délicatement le tampon ayant servi à prélever l'écoulement sur la lame. Fixez le frottis avec du méthanol, et non de la chaleur.
4. Étiquetez le prélèvement.
5. Effectuez une coloration de Gram sur le prélèvement.

Sources d'erreur :

Étiquetage incorrect

Prélèvement de l'échantillon juste après la miction

Technique de coloration inadéquate

Fixation par la chaleur

Mauvaise préparation du frottis

B. Prélèvement d'écoulement cervical (chez la femme)

Bien que la collecte d'échantillons soit normalement réalisée par des cliniciens (agents de santé, infirmiers), les techniciens de laboratoire sont censés connaître la procédure.

Matériel requis :

Spéculum

Coton sec

Solution physiologique

Lame et lamelle de microscope

Tampon de coton

Mode opératoire :

1. Humidifiez un spéculum vaginal à l'aide d'eau chaude stérile et insérez-le dans le vagin.
2. Nettoyez le col de l'utérus à l'aide d'un tampon humidifié avec une solution physiologique stérile.

3. Insérez un tampon de coton stérile dans le canal endocervical et faites-le tourner délicatement.
4. Réalisez un frottis sur lame pour appliquer la technique de coloration de Gram.
5. Étiquetez le prélèvement.

Sources d'erreur :

Étiquetage incorrect

Échantillon non représentatif

Technique de coloration inadéquate

Fixation par la chaleur

Mauvaise préparation du frottis

C. Prélèvement d'échantillon vaginal

Matériel requis :

Lame de microscope

Lamelle

Tampon de coton

Solution physiologique

Mode opératoire :

Prélevez un échantillon d'écoulement vaginal sur un tampon de coton stérile.

Si l'écoulement est prélevé pour

Répartissez l'échantillon sur la totalité de la surface du cercle à l'aide d'un agitateur.

Ajoutez une goutte de l'antigène RPR sur l'échantillon en maintenant le flacon en position verticale. Ne mélangez pas.

Balancez la carte manuellement ou à l'aide d'un balancier mécanique (100 tpm) pendant 8 minutes.

Interprétez les résultats par une inspection visuelle à l'aide d'un dispositif d'éclairage suffisant. Aucun grossissement n'est nécessaire.

Interprétation des résultats :

Réaction positive - Présence nette de blocs de particules noires

Réaction négative - Absence d'agrégats

Sources d'erreur dans le déroulement du test :

Une technique inappropriée peut entraîner des résultats faux positifs ou faux négatifs.

Une température de stockage inappropriée peut entraîner des résultats faux positifs ou faux négatifs.

Un résultat faux positif peut être causé par d'autres affections telles que la lèpre, la tuberculose, le paludisme ou les maladies auto-immunes ou encore par une grossesse.

3.3.5.2. Diagnostic en laboratoire du VIH

Le diagnostic du VIH est généralement posé à l'aide d'un test sérologique. Il existe plusieurs types de tests, comme ELISA, les dot blots ou les tests d'agglutination. Les résultats peuvent être confirmés par des tests sérologiques plus spécifiques tels que le western blot. Cependant, la plupart de ces tests de laboratoire ne sont pas réalisables au niveau du Centre de Santé.

HIV tri -dot

Il s'agit d'un test d'anticorps simple et rapide pour la détection et la différenciation des anticorps dirigés contre le VIH-1 et le VIH-2.

Princip e :

Les antigènes des protéine

Figure 3.3.1: Mode opératoire (étapes) du test HIV tri-dot.

HIV tri-dot - VIH-1, VIH-2 – 1. Distribuez 3 gouttes de solution de lavage. – 2. Déposez une goutte d'échantillon du patient. – 3. Distribuez 5 gouttes de solution de lavage. – 4. Distribuez 2 gouttes de conjugué. – 5. Distribuez 3 gouttes de solution lavante. – Positif pour le VIH-1. – Positif pour le VIH-1 et le VIH-2. – Positif pour le VIH-2. – 6. Observez les points rosacés dans la zone de test. Interprétez-les tel qu'expliqué ci-dessus.

3.3.5.3.

Appliquez une lamelle.

Examinez la préparation au microscope avec un objectif de faible puissance.

Interprétation des résultats :

Le test est négatif si aucune cellule ovale bourgeonnante ni aucun pseudohyphe ne sont observables.

Le test est positif si des cellules de levure bourgeonnantes ou des hyphes sont observables.

3.3.5.6. Diagnostic en laboratoire de ***C. trachomitis***

Culture et tests sérologiques

Sont irréalisables au niveau du Centre de Santé primaire. Même s'ils étaient réalisables, ces tests ne permettraient pas de prendre rapidement la décision de traiter le patient étant donné qu'au moins deux jours sont nécessaires pour obtenir les résultats, en particulier en ce qui concerne la culture.

3.3.5.7. Diagnostic en laboratoire du virus de l'hépatite B (VHB)

Tests s érologiques

Une large gamme de tests sérologiques est désormais disponible pour détecter les antigènes du VHB, en particulier HBsAg, prélevé dans le sérum au cours du stade aigu de l'infection. Néanmoins, ces tests ne sont pas disponibles au niveau du Centre de Santé primaire.

3.3.6. Assurance de qualité

L'assurance de qualité en matière de techniques de laboratoire est essentielle pour pouvoir obtenir des informations fiables, traiter les patients efficacement et contrôler les maladies infectieuses au sein de la communauté.

Les techniques de contrôle qualité mises en œuvre en laboratoire empêchent le gaspillage des ressources et permettent d'obtenir les résultats le plus rapidement possible.

3.4. Module satellite pour les agents de s anté communautaires

3.4.1. Introduction

3.4.1.1.

1. Le principal risque de contamination par une IST est :
    A. le fait d’avoir un seul partenaire sexuel.
    B. le fait d’avoir de multiples partenaires sexuels.
    C. le fait de ne pas utiliser ou de mal utiliser le préservatif.
    D. B et C.
2. L’IST la plus fréquente/les IST les plus fréquentes en Éthiopie est/sont :
    A. la gonorrhée
    B. la syphilis
    C. le chancre mou
    D. A, B et C
3. Les IST se transmettent

Dans ces derniers, les IST sont responsables de pas moins de 15 % de la charge de morbidité parmi la population urbaine. Elles se classent également au deuxième rang, après le paludisme, des maladies dont l'impact socio-économique sur les communautés tropicales est le plus lourd. En outre, les personnes souffrant d'une IST sont plus susceptibles de transmettre et d'être contaminées par le VIH.

En Éthiopie, on constate également une aggravation des IST et du VIH/sida en termes d'ampleur et d'intensité du fait des facteurs suivants :

De plus en plus d'individus s'établissent ou voyagent dans de grandes villes, où ils sont souvent séparés de leur famille.

De plus en plus d'individus ont une activité sexuelle avant le mariage.

Le niveau de connaissance des IST est faible parmi la population.

Le comportement des individus sexuellement actifs n'évolue pas.

Il existe un lien significatif entre les IST et la transmission sexuelle du VIH.

Les IST affectent les individus jeunes, c'est-à-dire la fraction productive de la communauté, ce qui conduit à des problèmes d'ordre économique et social.

3.4.4. Objectifs d'apprentissage

Après avoir étudié ce module auxiliaire, l'agent de santé communautaire saura :

définir les infections sexuellement transmissibles ;

considérer les IST comme un problème de santé publique majeur ;

citer les infections sexuellement transmissibles les plus courantes au sein de la communauté ;

expliquer les causes des IST ;

reconnaître que les infections sexuellement transmissibles sont causées par des micro-organismes pathogènes ;

décrire la classification et l'approche syndromique de prise en charge des infections sexuellement transmissibles courantes ;

reconnaître l'importance d'un aiguillage immédiat des patients vers des structures de soins supérieures ;

expliquer les mesures préventives des IST.

3.4.5. Définition et description des infections sexuellement transmissibles

Les infections sexuellement transmissibles sont des maladies contagieuses se transmettant essentiellement d'une personne infectée à une personne saine par contact sexuel. Il existe plus de 20 types de micro-organismes (infections) pouvant se transmettre lors de rapports sexuels non protégés.

Les IST les plus courantes en Éthiopie sont :

la gonorrhée,

la syphilis,

le chancre mou,

symptômes et des signes courants d'IST. On appelle cet ensemble de symptômes/signes un syndrome.

L'approche syndromique en matière d'IST consiste à classer les principales infections selon les syndromes observables qu'elles engendrent. Les maladies sont ainsi classées en fonction des signes et symptômes (caractéristiques cliniques) dont elles sont responsables. Les syndromes sont les suivants : ulcère génital, écoulement vaginal, écoulement urétral, douleur abdominale basse et bubon inguinal.

3.4.7.1. Syndrome d'ulcère génital (chez l'homme et la femme)

Le patient se plaint de plaies ou d'ulcères pouvant être douloureux ou indolores sur ses parties génitales. Un ulcère est une rupture dans la continuité de la surface de la peau ou de la muqueuse.

La période d'incubation d'un ulcère génital est comprise entre 4 jours et 13 semaines (généralement 1 à 4 semaines). Dans de nombreux pays en développement, les étiologies les plus fréquentes du syndrome d'ulcère génital sont la syphilis et le chancre mou.

3.4.7.2. Syndrome d'écoulement vaginal

La patiente se plaint de pertes vaginales dont la couleur, l'odeur, la consistance ou la quantité sont différentes de celles de l'écoulement habituel. Ce syndrome peut s'accompagner de démangeaisons vaginales ainsi que de douleurs à la miction et pendant les rapports sexuels.

Le syndrome3 TD [(7f6(éci)L Tc)(nc)4 le[1.63 e[1.d7004 Tw7(t4 Tc -0.004 TTD [(7f64(uel)6(s1

Aiguillage immédiat des patients et incitation à amener le/la partenaire en consultation pour que celui-ci/celle-ci puisse bénéficier d'un diagnostic et d'un traitement précoces.

Suivi des cas afin de contrôler l'adhésion au traitement.

Incitations et conseils aux patients en vue de les amener à se rendre dans des institutions sanitaires en cas d'échec du traitement.

3.4.10. Prévention et contrôle des IST

Abstinence sexuelle

Limitation du nombre de partenaires sexuels

Utilisation systématique et appropriée du préservatif

Éducation à la santé sur les causes et les modes de transmission des IST

Détection précoce et aiguillage immédiat des cas d'IST

Participation au suivi des cas :

- adhésion au traitement
- échec du traitement
- recherche des partenaires

3.4.11. Analyse des missions des agents de santé communautaires

3.4.11.1. Objectifs de connaissance et activités

Objectifs d'apprentissage	Activités
Définir les IST	- Expliquer que les IST se transmettent par contact sexuel - Citer les IST les plus courantes
Décrire les causes des IST	- Expliquer que les IST sont causées par des micro-organismes et ne s'attrapent pas en urinant face à la lune
Reconnaître les facteurs de risque d'IST	- Expliquer que les IST peuvent être une conséquence de : . la multiplicité des partenaires sexuels . la non utilisation ou l'utilisation inappropriée du préservatif
Expliquer l'approche et la classification syndromiques des IST	- Décrire la classification syndromique des IST - Citer les 7 classifications syndromiques des IST
Reconnaître les IST comme un problème de santé publique majeur	- Expliquer que les IST sont un problème sanitaire majeur en Éthiopie - Énumérer les complications courantes des IST - Décrire le lien entre les IST et le VIH/sida
Décrire la prévention et le contrôle des IST	- Expliquer l'importance de : . l'abstinence sexuelle . la limitation du nombre de partenaires sexuels . l'utilisation appropriée du préservatif . la prise en charge des partenaires - Mentionner l'importance d'une détection précoce et d'un aiguillage immédiat des cas d'IST - Décrire l'importance de l'éducation à la santé dans la prévention et le contrôle des IST

3.4.11.2. Attitude, objectifs et activités

Objectifs d'apprentissage	Activités
- Admettre que les IST se transmettent d'une personne malade à une personne saine	- Admettre que les IST ne s'attrapent pas en urinant face à la lune - Admettre que ce sont les micro-organismes qui provoquent les IST
- Reconnaître que les IST sont un problème de santé publique majeur	- Admettre que les IST sont un problème sani e[(A)1(d)10(m)-3(d [(A7)d

	- Participer à la promotion et à la distribution de préservatifs dans la communauté - Orienter les patients en matière de conseil et de dépistage du VIH/sida - Enregistrer les cas d'IST - Rédiger des rapports sur les IST

Vous avez à présent terminé d'étudier ce module, mais afin de vous auto-évaluer, vous devez effectuer le test préliminaire en tant que test d'évaluation.

Utilisez une feuille séparée.

Enfin, confrontez vos réponses au test préliminaire et au test d'évaluation aux corrigés figurant dans l'Unité 3.5.12 et évaluez vos progrès.

3.4.12. Corrigé du test préliminaire et du test d'évaluation

Vrai (V) et Faux (F)

1. F
2. V
3. F

QCM

4. D
5. D
6. B
7. D
8. B

3.5. Points à retenir pour les soignants non professionnels

3.5.1. Importance des IST comme problème sanitaire majeur

Les infections sexuellement transmissibles (IST) représentent un problème de santé publique de première importance affectant de nombreux individus dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement.

Dans ces derniers, les IST sont responsables de pas moins de 15 % de la charge de morbidité parmi la population urbaine. Elles se classent également au deuxième rang, après le paludisme, des maladies dont l'impact socio-économique sur les communautés tropicales est le plus lourd. En outre, les personnes contaminées par une IST sont plus vulnérables au VIH/sida.

En Éthiopie, on constate également une aggravation des IST et du VIH/sida en termes d'ampleur et d'intensité du fait des facteurs suivants :

De plus en plus d'individus s'établissent ou voyagent dans de grandes villes, où ils sont souvent séparés de leur famille.

De plus en plus d'individus ont une activité sexuelle avant le mariage.

Le niveau de connaissance des IST est faible parmi la population.

Le comportement des individus sexuellement actifs n'évolue pas.

Il existe un lien significatif entre les IST et la transmission sexuelle du VIH.

Les IST affectent les individus jeunes, c'est-à-dire la fraction productive de la communauté, ce qui conduit à des problèmes d'ordre économique et social.

3.5.2. Définit ion et description des infections sexuellement transmissibles

Les infections sexuellement transmissibles sont des maladies contagieuses se transmettant essentiellement d'une personne infectée à une personne saine par contact sexuel. Il existe plus de 20 types de micro-organismes (infections) pouvant se transmettre lors de rapports sexuels non protégés.

Les IST les plus courantes en Éthiopie sont :

la gonorrhée,

la syphilis,
le chancre mou,
le lymphogranulome vénérien.

Ces maladies sont causées par des micro-organismes pathogènes visibles uniquement au microscope. Elles ne s'attrapent pas en urinant face à la lune, comme le croient beaucoup de citoyens de notre pays.

3.5.3. Facteurs de risque

Une personne saine court un risque plus important de contracter une IST lorsqu'elle :

pratique une activité sexuelle avec plus d'un partenaire ;
n'utilise pas ou mal le préservatif au cours de son activité sexuelle ;
a des rapports sexuels avec un individu symptomatique, c'est-à-dire avec une personne présentant les caractéristiques cliniques (signes et symptômes) d'une IST.

3.5.4. Classification et approche syndromiques de prise en charge des IST

Bien qu'il existe plus de 20 micro-organismes pouvant se transmettre par contact sexuel, ces différentes IST ont tendance à provoquer des signes et des symptômes similaires. Ainsi, l'écoulement du pénis (urètre) ou du vagin et l'ulcère génital sont des symptômes et des signes courants d'IST. On appelle cet ensemble de symptômes/signes un syndrome.

Il est possible de classer les principales infections selon les syndromes observables qu'elles engendrent. Les maladies sont ainsi classées en fonction des signes et

En l’absence de traitement, les IST peuvent conduire, chez l’homme comme chez la femme, à l’infertilité, à des douleurs chroniques ou au décès.

Certaines IST peuvent se transmettre de la mère à l’enfant au cours de la grossesse et pendant l’accouchement.

Elles peuvent causer la surdité et la cécité du nouveau-né.

La présence d’IST accroît également le risque de transmission du VIH.

Certaines IST peuvent provoquer un cancer du col de l’utérus et un avortement spontané.

3.5.6. Prise en charge des IST

Aiguillage immédiat des patients et incitation à amener le/la partenaire en consultation pour que celui-ci/celle-ci puisse bénéficier d’un diagnostic et d’un traitement précoces.

Adhésion des patients au traitement.

Incitations et conseils aux patients en vue de les amener à se rendre dans des institutions sanitaires en cas d’échec du traitement.

3.5.7. Prévention et contrôle des IST

Abstinence sexuelle

Limitation du nombre de partenaires sexuels

Utilisation systématique est appropriée du préservatif

Sensibilisation aux causes et aux modes de transmission des IST

Traitement précoce des cas d’IST

Participation au suivi des cas :

- adhésion au traitement
- échec du traitement
- recherche des partenaires

N°	Objectifs d'apprentissage	Activités d'apprentissage			
		AS	ISP	SSPE	TL
4.	Décrire les caractéristiques cliniques des syndromes liés aux IST	- Identifier les caractéristiques cliniques générales des IST selon l'approche syndromique	- Identifier les caractéristiques cliniques générales des IST selon l'approche syndromique		

N°	Objectifs d'apprentissa ge	Activités d'apprentissage			
		AS	ISP	SSPE	TL
7.	Décrire les avantages de l'approche syndromique dans la prise en charge des IST	- Citer les avantages de la prise en charge syndromique des cas d'IST - Exposer l'importance des diagrammes de flux dans la prise en charge des IST - Identifier les différents diagrammes de flux applicables aux différents syndromes des IST	- Citer les avantages de la prise en charge syndromique des cas d'IST - Exposer l'importance des diagrammes de flux dans la prise en charge des IST - Identifier les différents diagrammes de flux applicables aux différents syndromes des IST	- Citer les avantages de la prise en charge syndromique des cas d'IST - Exposer l'importance des diagrammes de flux dans la prise en charge des IST	- Citer les avantages de la prise en charge syndromique des cas d'IST - Exposer l'importance des diagrammes de flux dans la prise en charge des IST
8	Décrire les principales caractéristiques de la prise en charge syndromique des cas	- Décrire l'importance de la prise d'antécédents et de l'examen clinique - Citer les différentes recherches en laboratoire permettant de diagnostiquer les IST	- Décrire l'importance de la prise d'antécédents et de l'examen clinique - Citer les différentes		

Citer les différentre perent1ent 0.001 Tw 0.277 0 Td [(C)-3(i)3(t)-1(er)-6( )-12(l)3(es)-8(d)-12(i)3(f)-13(f)-

Tableau 4.2 : Attitude, objectifs et activités

N°	Objectifs d'apprentissage	Activités d'apprentissage			
		AS	ISP	SSE	TL
1	Reconnaître l'importance des IST en Éthiopie en matière de santé publique	- Reconnaître que les IST sont un problème sanitaire majeur en Éthiopie	- Reconnaître que les IST sont un problème sanitaire majeur en Éthiopie	- Reconnaître que les IST sont un problème sanitaire majeur en Éthiopie	- Reconnaître que les IST sont un problème sanitaire majeur en Éthiopie
2	Reconnaître que les IST peuvent conduire à des complications graves	- Reconnaître l'importance d'une détection et d'un traitement précoces des IST pour éviter les complications	- Reconnaître l'importance d'une détection et d'un traitement précoces des IST pour éviter les complications	- Reconnaître l'importance d'une détection et d'un traitement précoces des	

08 3v5.04 Tm ( )T10.48 59.76 34.08 .24 398.09.6 0 /P <</MCID 16 >>

N°	Objectifs d’apprentissage	Activités d’apprentissage

Tableau 4.3 : Pratiques, objectifs et activités

N°	Objectifs d'apprentissage	Activités d'apprentissage

N°	Objectifs d'apprentissage	Activités d'apprentissage			
		AS	ISP	SSE	TL
6.					

8.	- Travailler en équipe dans la prise en charge, la prévention et le contrôle des IST	- Adopter une approche de travail en équipe dans la prise en charge, la prévention et le contrôle des IST	- Adopter une approche de travail en équipe dans la prise en charge, la prévention et le contrôle des IST	- Adopter une approche de travail en équipe dans la prise en charge, la prévention et le contrôle des IST	- Adopter une approche de travail en équipe dans la prise en charge, la prévention et le contrôle des IST

PARTIE 5

GLOSSAIRE ET ABRÉVIATIONS

Glossaire

Conseil : Le conseil correspond à une relation et à un dialogue ininterrompus entre le patient et son conseiller.

In vitro : Qualifie une réaction chimique, une température, etc., observées en éprouvette.

In vivo : Qualifie des processus chimiques vitaux, par exemple, observés dans un organisme vivant, par opposition à *in vitro*.

Syndrome : Ensemble de symptômes associé à tout processus morbide.

Abréviations

CMV : Cytomégalovirus

ELISA : Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (*test d'immunoabsorption enzymatique*)

FTA : Fluoresent Treponemal Antibody (*anticorps tréponémique fluorescent*)

VHB : Virus de l'hépatite B

VIH : Virus de l'immunodéficience humaine

DIU : Dispositif intra-utérin

PQRST : facteurs provocants ou contributifs, qualité, rayonnement et soulagement, symptômes, aspect temporel

RPR : Rapid Plasma Region (*test rapide de la réagine plasmatique*)

IST : Infection sexuellement transmissible

TPHA : Treponema Pallidum Hemagglutinations Assay (*test d'hémagglutination des tréponèmes*)

VDRL : Veneral Disease Research Laboratory (*recherche de laboratoire sur les maladies vénériennes*)

OMS :

PARTIE 6

BIBLIOGRAPHIE

1. Abrams Collins A. Clinical drug therapy – Rational for Nursing practice: 3rd edition, J.B Lippincott company, Philadelphia, Pennsylvania (PP: 405-452)
2. Adel A.F Mohammed, Tropical and Geographical Medicine, 2nd ed., 1993.
3. Africa Health, vol. 23 No. 5 July 2001, PP. 16 – 18.
4. BSS CD - Eritrean training manual on VCT
5. Benenson Abram S. Control of communicable disease manual, 16th edition, 1995.
6. Birhan, Research and Development consultancy and Population studies and Training center with Packard Foundation. February 2001, Addis Ababa.
7. Cheesbrough, Medical laboratory manual for tropical countries, Vol II, 3rd ed, 1991, Cambridge.
8. Control of communicable disease manual, Abram S.Benenson, 16th edition, 1995.
9. Dr. A.A ARKUTU Healthy women, Healthy mothers: an information guide. 1995.
10. Ethiopian Journal of Health Development Vol. 14, No. 1 April 2000.
11. Family Health International -

18. Mackie and McCartney, Practical Medical Microbiology, 13th ed 1989 Longman.
19. Merck manual 16th edition.
20. Ministry of Health, FDRE National guideline for management of STIs, AA.
21. Morbidity and Mortality Weekly Report, 1998, Guidelines for Treatment of sexually Transmitted Diseases January 23, 1998 /vol. 47/NoRR – 1.
22. National guide line for the management of sexually transmitted infections using the syndromic approach. Ministry of health, disease prevention and control department. HIV/AIDS and other STIs prevention and control team. November 2001.
23. National guidelines for the management of sexually transmitted infections using the syndromic approach, ministry of health, December 2001.
24. Park's Text book of preventive and social medicine 15th edition, 1997.
25. Ramink Sood, Medical Laboratory Technology methods and interpretation, 5th, 1999.
26. Sexually transmitted diseases, Reproductive health series, Family Health I International, January 1999.
27. Smeltzer Suzanne C. Brenda G. Bare Brunner and Suddarth's Textbook of Medical. Surgical Nursing 7th J.B. Lippincot Company Philadelphia pp 1918 - 1919)
28. The Lancet STD vol. 351. 1998.
29. The Lancet, sexually transmitted disease Vol. 351. 1998 (suppl 111): 2 – 4 and (suppl 111) 29 – 32.
30. WHO, AIDS series 8: Guidelines for counseling about HIV infection and disease, 1990.
31. WHO. Management of sexually transmitted diseases at district and PHC level. Geneva, A.I.T.B.S. publishers and distributors, Delhi, 1999: page 33-34
32. 2001 up to date www.uptodate.com.

PARTIE 7

ANNEXES

7.1. Corrigés du test prélim inaire et du test d'évaluation

Partie I : Corrigés du test préliminaire et du test d'évaluation pour toutes les catégories de l'équipe du Centre de Santé

1. Vrai
2. Faux
3. Faux
4. Faux
5. Vrai
6. Vrai
7. Faux
8. Faux
9. Vrai
10. Vrai
11. Vrai
12. Faux
13. Faux
14. C
15. E
16. E
17. C
18. E
19. Écoulement urétral et brûlures à la miction
20. La maladie inflammatoire pelvienne (MIP)
21. *N. gonorrhoeae* et *C. trachomatis*

- De plus en plus d'individus s'établissent ou voyagent dans de grandes villes, où ils sont souvent séparés de leur famille.
- De plus en plus d'individus ont une activité sexuelle avant le mariage.
- Le phénomène de résistance aux médicaments prend de l'importance.
- Le niveau de connaissance des IST est faible parmi la population.
- Le comportement des individus sexuellement actifs n'évolue pas.

22. Les infections sexuellement transmissibles se transmettent d'un individu à un autre par contact sexuel.

24. - Elle est simple, peu coûteuse, rapide et permet une mise en œuvre à grande échelle.
- Elle requiert peu de formation et peut être utilisée par plusieurs catégories d'agents de santé.
- Elle permet de poser un diagnostic et d'initier un traitement dès la première consultation.

25. - un comportement sexuel moins risqué
- une éducation en matière de prévention des IST
- la détection et le traitement précoces des cas
- l'identification, la notification et l'évaluation des partenaires sexuels
- le conseil

26. - les travailleurs du sexe
- les chauffeurs routiers de longue distance
- les adolescents
- le personnel militaire
- les prisonniers

27. - les leaders communautaires
- les leaders religieux
- les agents de santé communautaires

28. En raison de :

- leur ampleur
- leurs graves complications potentielles
- leur lien avec le VIH/sida

Partie II: Corrigés du test préliminaire et du test d'évaluation spécifiques à chaque catégorie professionnelle.

I. Pour les agents de santé

1. Vrai
2. Faux
3. Vrai
4. Vrai
5. B
6. B
7. A
8. B
9. E
10. C
11. A
12. C
13. A
14. Chancre
15. Herpès génital
16. *N. gonorrhoeae*, *T. pallidum*, *C. trachomatis*, *H. ducreyi*, *C. granulomatis*, etc.
17. Cf. section 3.1.5
18. Cf. section 3.1.5.1
19.

18.

2. L’anxiété liée à la gêne et à la crainte, la non adhésion au traitement du fait de la nature stigmatisante des IST, le déficit de connaissance et le potentiel de réinfection.
3. Le conseil est adapté aux besoins des patients et se focalise sur les problèmes immédiats dans le cadre d’une approche fondée sur l’individu, contrairement à l’éducation à la santé.
4. La prévention de la transmission des infections et le soutien psychosocial aux individus déjà touchés.
5. Effets secondaires : nausées, vomissements, bouche douloureuse, taches blanches sur la muqueuse buccale, diarrhée et éruptions cutanées ; contre-indications : femmes enceintes, enfants de moins de 8 ans et mères allaitant ; précision dans l’administration, administration 1 ou 2 heures avant l’ingestion d’anti-acides ou de lait, administration 1 ou 2 heures après un repas.
6. Le lavage des mains, le port de gants.

III. Pour les techniciens de laboratoire

1. E
2. D
3. C
4. B
5. D
6. B
7. D
8. D
9. E
10. E

Traitement d’un syndrome d’écoulement urétral :

Traitez votre patient pour la gonorrhée et l’infection à chlamydia. Les schémas de traitement recommandés sont les suivants :

ciprofloxacine 500 mg en dose orale unique

ou

spectinomycine 2 g en dose orale unique par voie intramusculaire

ou

norfloxacine 800 mg en dose orale unique

ou

ceftriaxone 250 mg en dose orale unique par voie intramusculaire

et

doxycycline 100 mg par voie orale 2 fois par jours pendant 7 jours

ou

tétracycline 500 mg par voie orale 4 fois par jour pendant 7 jours

ou

érythromycine 500 mg par voie orale 4 fois par jour pendant 7 jours

Les partenaires sexuels doivent recevoir le même traitement.

Diagramme 2-

Traitement d’un syndrome d’écoulement vaginal

Si l’évaluation des risques est négative, traitez la patiente par métronidazole et nystatine ou clotrimazole.

En présence de facteurs de risque, traitez la patiente par ciprofloxacine 500 mg en dose orale unique

ou

spectinomycine 2 g en dose unique par voie intramusculaire

Les partenaires doivent être inclus dans la prise en charge de toutes les causes d'infection, sauf en cas de candidose et de vaginite bactérienne, qui ne se transmettent généralement pas par voie sexuelle. Les infections gonococciques, chlamydiennes et à trichomonase doivent en particulier faire l'objet d'un traitement.

Diagramme 3 : Syndrome d'ulcère génital



Traitement d’un syndrome d’ulcère génital

Traitement pour la syphilis :

2,4 millions d’unités de benzathine-pénicilline en dose unique par voie intramusculaire.

En cas d’allergie à la pénicilline :

érythromycine 500 mg par voie orale 4 fois par jours pendant 15 jours

ou

doxycycline 100 mg par voie orale 2 fois par jour pendant 15 jours

ou

tétracycline 500 mg par voie orale 4 fois par jour pendant 15 jours

et

Traitement pour le chancre mou :

érythromycine 500 mg par voie orale 4 fois par jours pendant 7 jours

Alternative :

cotrimoxazole 2 comprimés par voie orale 2 fois par jour pendant 7 jours

ou

spectinomycine 2 g en dose unique par voie intramusculaire.

Si l’ulcère s’accompagne de vésicules, traiter pour un herpès génital.

Traitement d’un syndrome de douleur abdominale basse chez la femme

Le traitement doit couvrir les infections à gonocoques, à chlamydia et à bactéries anaérobies.

Ciprofloxacine 500 mg en dose orale unique

ou

norfloxacine 800 mg en dose orale unique

ou

spectinomycine 2 g en dose unique par voie intramusculaire

ou

ceftriaxone 250 mg en dose unique par voie intramusculaire

et

doxycycline 100 mg par voie orale 2 fois par jour pendant 14 jours

ou

tétracycline 500 mg par voie orale 4 fois par jour pendant 14 jours

ou

érythromycine 500 mg par voie orale 4 fois par jour pendant 14 jours

et

métronidazole 400 mg par voie orale 2 fois par jour pendant 14 jours

Les partenaires sexuels masculins récents doivent être traités pour la gonorrhée et une infection à chlamydia.

Diagramme 6 : Bubon inguinal



Traitement d'un syndrome de bubon inguinal :

Si le bubon inguinal s'accompagne d'un ulcère génital, traiter le patient avec :

2,4 millions UI de benzathine-pénicilline G en dose unique par voie intramusculaire

et

érythromycine base 500 mg par voie orale 4 fois par jour pendant 3 semaines

ou

2 comprimés de cotrimoxazole par voie orale 2 fois par jour pendant 15 jours (480 mg).

En cas de bubon inguinal sans ulcère génital, traiter le patient avec :

tétracycline 500 mg par voie orale 4 fois par jour pendant 14 jours.

ou

érythromycine 500 mg par voie orale 4 fois par jour pendant 14 jours.

Si le bubon devient fluctuant, le pus doit être aspiré à l'aide d'une aiguille tous les 3 jours jusqu'à assèchement. L'aspiration doit s'effectuer à travers une peau non lésée.

N.B : Ne pas inciser et drainer directement le ganglion lymphatique. Les partenaires sexuels doivent recevoir le même traitement.

Diagramme 7 : Conjonctivite néonatale



Traitement d’une conjonctivite néonatale

CeftriastBr(onc)-5(t)2(e 5nc)-0 0 Tw--0.006 Tw9.96 0 0 [5(nt)-3g/kg 4 Tc -0.004 Tw [(n)20 0